

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

알레르기성 접촉성습진이 나타나기 쉬운 환자

2. 부작용

- 1) 과민증 : 발진 등이 나타날 경우에는 사용을 중지할 것.
- 2) 정신신경계 : 고열, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 구역이 나타날 수 있다.
- 4) 입안 : 발진, 두드러기, 미란, 드물게 입안, 인두(입안과 식도 사이에 있는 소화관 의 일부)의 작열감 등 입안의 점막 과민반응이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.

3. 적용상의 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량에 따라 사용하십시오.
- 2) 이 제품은 마시지 마십시오.
- 3) 본 제품에는 불소가 함유되어 있으므로 잘못 마셨을 경우에는 약사 또는 의사의 지시에 따르십시오.
- 4) 6세이하의 어린이에게는 약사 또는 의사의 지시없이 사용하지 마십시오.
- 5) 6세 이하의 어린이가 사용할 경우 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용하십시오.

4. 저장상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것