

사용상의주의사항

1.다음 환자에는 사용하지 말 것

- 1)만 3세 이하의 어린이
- 2)이 제품에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

2.다음 부위에는 사용하지 말 것

- 1)눈주위, 점막등
- 2)습윤,울등에 의한 피부염, 상처부위

3.다음의 경우에는 신중히 사용할 것(사용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1)약이나 화장품 등에 의한 알레르기증상(발진,발적,가려움증,울에 의한 피부염 등이 나타난적이 있는 사람)
- 2)습윤이나 진무름이 심한 사람
- 3)의사를 치료를 받고 있는 사람
- 4)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5)수유부

4.부작용

- 1)이 제품의 사용으로 인해 발진,발적(종창),가려움증 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것
- 2)수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

5.일반적 주의

- 1)정해진 용법용량을 지킨다
- 2)어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여한다
- 3)눈에 들어가지 않도록 주의할 것 만일 누네 들어간 경우에는 물로 씻을 것 증상이 심한 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것

4)이 제충은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것

5)사용전에 잘 흔들어 사용할 것

6)환부로부터 10cm의 거리에서 뿌릴 것

7)동일부위에 연속하여 3초이상 뿌리지 말 것

8)살리실산메틸은 피부를 통하여 많은 양이 흡수될 경우 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 표면에 대한 장기간의 사용은 피한다.

6.저장상 주의사항

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2)직사광선을 피하고 도리 수 있으면 습기각 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것

3)온도가 40℃이상이 도는 곳에 보관하지 말 것

4)오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

5)불 근처에 두지 말 것

6)불꽃을 향하여 사용하지 말 것

7)화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것

8)불 속에 버리지 말 것

9)난로,풍로등 화기부근에서 사용하지 말 것

10)밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것

11)사용후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것