

사용상의주의사항

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 30개월 이하의 유아
- 2) 눈 주위, 점막 등
- 3) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(사용 전 의사 또는 약사와 상의할 것).

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적, 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤이나 미란(긁무름)이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있다)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 수유부

3. 부작용

이 약의 사용으로 인해 발진·발적, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4) 살리실산메틸은 피부를 통하여 많은 양이 흡수될 경우 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 표면에 대한 장기간의 사용은 피한다.

5. 적용상의 주의

1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.

2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.