

사용상의주의사항

1. 금기

30개월 이하의 유아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 눈주위, 점막등
- 2) 습윤, 옷등에 의한 피부염, 상처부위

3. 다음 사람은 사용 전에 약사 또는 의사와 상의할 것.

- 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증, 옷등에 의한 피부염등)이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 습윤이나 짓무름이 심한 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 수유부

4. 사용할 때 다음에 주의할 것.

- 1) 정해진 용법.용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 경련을 유발할 수 있으므로 신중히 투여할 것.
- 3) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것.증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것
- 4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
- 5) 사용 전에 잘 흔들어 사용할 것.
- 6) 환부로부터 20cm의 거리에서 뿌릴 것.
- 7) 동일 부위에 연소하여 3초 이상 뿌리지 말 것.

8) 살리실산메틸은 피부를 통하여 많은 양이 흡수될 경우 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 표면에 대한 장기간의 사용은 피한다.

5. 사용중 또는 사용 후에는 다음에 주의할 것.

1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발작(종창), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.

2) 수일간 사용하여도 증상이 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것

6. 보존 및 취급상의 주의

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존할 것.

2) 온도 40℃ 이상되는 장소에 보관하지 말 것.

3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

4) 불 근처에 두지 말 것.

5) 화염을 향하여 뿌리지 말 것.

6) 사용후 용기를 불 속에 넣지 말 것.

7) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것.

8) 사용후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것.

9) 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.

10) 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것.

11) 난로, 풍로등 화기부근에서 사용하지 말 것.