

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 만 3세 이하의 어린이.
- 2) 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자.

2. 다음 부위에는 투여하지 말 것.

- 1) 눈주위, 점막 등
- 2) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위.

3. 다음 경우에는 신중히 투여할 것(사용 전 의사 또는 약사와 상의할 것).

- 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람.
- 2) 습윤이나 진무름이 심한 사람.
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성.
- 5) 수유부.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 사용한다.
- 3) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것.
- 4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
- 5) 사용 전에 잘 흔들어 사용할 것.
- 6) 환부로부터 10cm의 거리에서 뿌릴 것.

7) 동일 부위에 연속하여 3초 이상 뿌리지 말 것.

8) 살리실산메틸은 피부를 통하여 많은 양이 흡수될 경우 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 표면에 대한 장기간의 사용은 피한다.

5. 부작용

1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(종창), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우 에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

2) 수 일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

3) 온도가 40℃ 이상 되는 장소에 보관하지 말 것.

4) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

5) 불 근처에 두지 말 것.

6) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것.

7) 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것.

8) 불 속에 버리지 말 것.

9) 난로, 풍로 등 화기 부근에서 사용하지 말 것.

10) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것.

11) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것